



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ:

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ:

ΑΡ.ΘΑΛΑΜΟΥ: ΚΛΙΝΗ:

ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ NORTON

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------|
| Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο: |
| Ημερομηνία Γέννησης: | Ηλικία: | |
| Διάγνωση: | Συνοδές Παθήσεις: | |
| Ημερομηνία Εισαγωγής: | Ημερομηνία Εξόδου: | |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Καλή | 4 | | | | | | | | |
| Μέτρια | 3 | | | | | | | | |
| Κακή | 2 | | | | | | | | |
| Πολύ κακή | 1 | | | | | | | | |
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | | | | | | | | | |
| Διαύγεια | 4 | | | | | | | | |
| Απάθεια | 3 | | | | | | | | |
| Σύγχυση | 2 | | | | | | | | |
| Κώμα | 1 | | | | | | | | |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | | | | | | | | | |
| Περιπατητικός | 4 | | | | | | | | |
| Περπατάει με βοήθεια | 3 | | | | | | | | |
| Κάθεται στην καρέκλα | 2 | | | | | | | | |
| Κατακεκλιμένος | 1 | | | | | | | | |
| ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | | | | | | | | | |
| Πλήρης | 4 | | | | | | | | |
| Ελαφρά περιορισμένη | 3 | | | | | | | | |
| Πολύ περιορισμένη | 2 | | | | | | | | |
| Ακινησία | 1 | | | | | | | | |
| ΑΚΡΑΤΕΙΑ | | | | | | | | | |
| Απούσα/Καθετήρας | 4 | | | | | | | | |
| Ακράτεια ούρων | 3 | | | | | | | | |
| Ακράτεια κοπράνων | 2 | | | | | | | | |
| Άκράτεια ούρων και κοπράνων | 1 | | | | | | | | |
| ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ | | | | | | | | | |
| Φυσιολογική | 4 | | | | | | | | |
| Μικρή | 3 | | | | | | | | |
| Ρινογαστρικός καθετήρας/Υγρά | 2 | | | | | | | | |
| Τίποτε από το στόμα/Ανορεξία | 1 | | | | | | | | |
| ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | | | | | | | | | |
| Φυσιολογικό βάρος | 4 | | | | | | | | |
| Παχυσαρκία | 3 | | | | | | | | |
| Καχεξία | 2 | | | | | | | | |
| Οίδημα | 1 | | | | | | | | |
| SCORE | | | | | | | | | |
| ΟΝΟΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ | | | | | | | | | |

NORTON SCORE

| | |
|---------------------------|---|
| SCORE > 19: | Επανεκτίμηση του ασθενούς με την κλίμακα Norton ανά πενήντημερο. |
| SCORE ≤ 19: | Ασθενής υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη κατακλίσεων, χρήζει υψηλής φροντίδας και παρακολούθησης ανα 3ήμερο. |
| Ανεξαρτήτως SCORE: | Επανεκτίμηση του ασθενούς κάθε εβδομάδα, μετά από χειρουργική επέμβαση, μετά από κάθε αλλαγή της κατάστασής του και πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο. |

300 cmx